

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛП - 006301-260620

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Регистрационный номер:

Торговое наименование

Бриллиантовый зеленый

Международное непатентованное или группировочное наименование

Бриллиантовый зеленый

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения спиртовой

Состав на 100 мл:

Действующее вещество:

Бриллиантовый зеленый - 1,0 г

Вспомогательные вещества:

Этанол (этиловый спирт) 95% - 56,0 г

Вода очищенная - до 100 мл

Описание

Прозрачная интенсивно зеленого цвета жидкость с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Антисептический препарат (активен в отношении грамположительных бактерий).

Показания к применению

Свежие послеоперационные и посттравматические рубцы, мейбомит, блефарит, пиодермия, ссадины, порезы, нарушения целостности кожных покровов.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бриллиантовому зеленому или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, блефарит, мейбомит, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

По имеющимся данным при правильном применении препарат Бриллиантовый зеленый можно применять при беременности и в период грудного вскармливания, однако, при его применении при беременности и в период грудного вскармливания следует соблюдать осторожность. *Не допускается применение препарата на кожу сосков.*

Способ применения и дозы

Наружно, наносят непосредственно на поврежденную поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани. *Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки!*

Если после лечения улучшения не наступает, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата. Вы должны обратиться к врачу, если симптомы ухудшаются или не улучшаются после 2-3 дней лечения.

Побочное действие

Жжение в месте нанесения, при попадании на слизистую оболочку глаза – жжение, слезотечение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Несовместим с дезинфицирующими средствами, содержащими йод, хлор, щелочи (в т.ч. раствор аммиака).

Особые указания

Не следует допускать попадания препарата на слизистые оболочки, т.к. спирт, содержащийся в составе препарата, может вызвать ожоги слизистых и/или сильное раздражение.

Не допускать попадания препарата в глаза!

Активность лекарственного препарата Бриллиантовый зеленый существенно снижается в присутствии сыворотки крови.

Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

При правильном применении не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Раствор бриллиантового зеленого несовместим с дезинфицирующими средствами, содержащими активный йод, хлор, щелочи, включая раствор аммиака.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой 1 %.

По 10, 15 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробками из полиэтилена низкого давления.

По 10, 25 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена низкого давления и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 10 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками полимерными навинчиваемыми, или крышками полимерными навинчиваемыми.

По 10, 25 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные крышками полимерными навинчиваемыми с помазком.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Формула-ФР»

Россия, 109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 139, офис 10

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872)41-04-73

Директор

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»



Л.Я. Рабинович