

**Заключение**  
**об эффективности применения инъекционной формы налтрексона**  
**продолжительного действия («Вивитрол»)**  
**в лечении опийной зависимости**

Достижение длительной и качественной ремиссии у пациентов с наркотической зависимостью является одной из основных задач всех медицинских наркологических учреждений РФ.

В России среди потребителей наркотиков подавляющее большинство (более 90%) является потребителями опиатов.

Опийная зависимость трудно поддается лечению по ряду причин: психическая и физическая зависимость у потребителей опиатов формируется очень быстро, влечение к наркотику у пациентов сильное, при этом, приверженность к терапии и мотивация низкие. Это определяет необходимость применения у этих пациентов современных высокоэффективных лекарственных средств и программ лечения и реабилитации.

На данный момент в России единственным препаратом фармакотерапии опийной наркомании является антагонист опиоидных рецепторов – налтрексон, который оказывает патогенетическое действие, снижая влечение к опиатам. До недавнего времени в лечебном процессе широко использовались зарегистрированные таблетированные формы налтрексона. С 2011 года в РФ был зарегистрирован пролонгированный инъекционный налтрексон («Вивитрол»). Пролонгированное действие препарата дает возможность постоянному в течение месяца и независимому от внешних причин терапевтическому воздействию налтрексона на нейромедиаторы, снижению влечения к опиатам.

Главный нарколог Российской Федерации проф. Брюн Е.А. в своем письме от 03.08.2011 № 797 рекомендовал применение препарата «Вивитрол» в сочетании с психотерапевтическими технологиями при проведении противорецидивной терапии и реабилитации больных опийной зависимостью, в том числе у пациентов инфицированных ВИЧ и вирусом гепатита С.

За период 2011-июнь 2012 г. в Городской Клинической больнице №17 препаратом «Вивитрол» было пролечено 50 пациентов с опийной зависимостью. Наблюдения и результаты использования препарата «Вивитрол» свидетельствуют о том, что данное лекарственное средство в комплексе с психотерапевтической поддержкой позволяет достичь ремиссии у пациентов, увеличивая ее длительность вдвое, положительно влиять на социализацию пациента и, в целом, улучшить качество его жизни.

Мы планируем дальнейшее использование препарата «Вивитрол» в Наркологической клинической больнице №17 Департамента здравоохранения города Москвы и можем рекомендовать его другим наркологическим учреждениям для лечения пациентов с опийной зависимостью.

Клячин А.И., заместитель главного врача  
Наркологической клинической больницы №17

