

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый МГМУ И.М.Сеченова Росздрав

УКБ №3

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ИМ. С.С. КОРСАКОВА

Заключение об эффективности препарата Вивитрол в лечении алкогольной зависимости

Клиника психиатрии имени С. С. Корсакова была одним из первых учреждений, которые в 2009 году начали применять пролонгированную форму налтрексона - «Вивитрол» для лечения пациентов с алкогольной зависимостью. «Вивитрол» заинтересовал врачей своей научно-обоснованной эффективностью и новым взглядом на известный в наркологии препарат - налтрексон – антагонист опиоидных рецепторов. Препарат пролонгированного действия открывал новые возможности для лечения зависимых пациентов: обеспечение режима терапии, повышение эффективности и безопасности за счет новой, инъекционной формы введения. С 2009 году нами было пролечено более 50 пациентов, на основе опыта применения данного препарата было опубликовано две статьи.

В ходе наших *практических наблюдений получены следующие данные по формированию ремиссии у больных алкоголизмом: часть пациентов, получившие курс от 6 до 11 инъекций, полностью отказались от употребления алкоголя после первой инъекции, длительность их ремиссии составляла от 8 до 18 месяцев. В некоторых случаях была достигнута так называемая «переменная ремиссия» - пациенты останавливали лечение после 3-4 инъекции, начинали употреблять алкоголь, однако затем вновь проходили повторный курс терапии и возвращались к инъекциям «Вивитрола». Суммарные (до и после рецидива) показатели продолжительности воздержания в этой группе от алкоголя находились в пределах 4–13 месяцев и в целом составляли 7 месяцев. Некоторые пациенты пробовали употреблять алкоголь в небольших дозах после первой инъекции. Однако, при отсутствии ожидаемого удовольствия от приема алкоголя, дальнейшее употребление прекращали; продолжительность ремиссии у таких больных равнялась 6–18 (в среднем – 8) месяцам.

Препарат, в целом, хорошо переносился пациентами. Из побочных явлений наблюдались: неприятные ощущения в месте инъекции, сонливость, заторможенность, головная боль. Однако эти симптомы проходили в течение первых нескольких дней.

Мы считаем, что препарат «Вивитрол» продемонстрировал высокую эффективность при лечении алкогольной зависимости, позволяя достичь ремиссии различной продолжительности или добиться уменьшения употребления алкоголя. По нашему мнению, «Вивитрол» по клинической эффективности во многом превосходит альтернативные средства лечения алкогольной зависимости и позволяет добиться улучшения состояния пациентов, вплоть до полной трезвости. Полученные данные позволяют нам рекомендовать препарат «Вивитрол» для включения в программы лечения алкогольной зависимости медицинскими учреждениями.

И.О. директора клиники
другими

медицинскими

Лукиянова Т.В.

