

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фито Ново-Сед®**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Фито Ново-Сед®**Международное непатентованное или группировочное наименование: -****Лекарственная форма:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь**Состав (на один пакетик):***Активный компонент:* Фито Ново-Сед®, экстракт жидкий* – 250,0 мг (в пересчете на сухое вещество).*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, повидон К-30, кремния диоксид коллоидный.

* Фито Ново-Сед®, экстракт жидкий получают из смеси лекарственного растительного сырья: мелиссы лекарственной травы – *Melissa officinalis L.*, сем. Яснотковых – *Lamiaceae*; пустырника сердечного (п. обыкновенного) – *Leonurus cardiaca L. (L. Cardiac L. subsp. Villosus (Desf.) Jav.)* и пустырника пятилопастного травы – *Leonurus quinquelobatus Gilib.*, сем. Яснотковых – *Lamiaceae*; шиповника (розы) плодов – *Rosa L.*, сем. Розоцветных – *Rosaceae*; боярышника плодов – *Crataegus L.*, сем. Розоцветных – *Rosaceae*; эхинацеи пурпурной травы – *Echinacea purpurea (L.) Moench*, сем. Астровых – *Asteraceae* в соотношении (1:1:1:0,5:0,5) экстракцией спиртом этиловым (этанолом) 40 %.

Описание

Смесь порошка и гранул светло-коричневого цвета, с характерным запахом. Допускается наличие более светлых и более темных вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа

Седативное средство растительного происхождения

Код АТХ: N05CM**Фармакологические свойства**

Препарат обладает седативным и анксиолитическим свойствами, способствует улучшению мозгового кровообращения; оказывает активирующее влияние на детоксицирующую систему печени (как на цитохром P450, так и на глутатионтрансферазу), повышает устойчивость организма к физическим нагрузкам.

Показания к применению

Невротические реакции, сопровождающиеся раздражительностью, бессонницей, тревогой, страхом, головной болью.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных; беременность; период грудного вскармливания; возраст до 18 лет; прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания); диффузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы); ВИЧ-инфекция; непереносимость лактозы; дефицит лактазы; глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата Фито Ново-Сед® противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым по 1 пакетику 3 раза в день за 30 минут до или через 40 минут после еды. Содержимое пакетика следует развести в $\frac{1}{4}$ стакана (50 мл) воды. Продолжительность курса лечения – до 2 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение препарата можно сочетать с другими лекарственными средствами, в том числе противовоспалительными, болеутоляющими средствами, антибиотиками.

Препарат Фито Ново-Сед® может оказывать влияние на метаболизм лекарственных препаратов, которые метаболизируются изоферментами системы цитохрома P450 (CYP).

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Фито Ново-Сед® проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

В рекомендованных дозах препарат Фито Ново-Сед® не вызывает сонливости и нарушения внимания, что позволяет принимать его в дневное время.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата в рекомендуемых дозах не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

По 5,0 г в пакетики из упаковочного комбинированного материала.

По 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 30 или 42 пакетика вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Пакетики могут быть размещены индивидуально или скреплены попарно.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия,

249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

АО «ФПК ФармВИЛАР», Россия, 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7

Тел./факс: +7 (499) 372-13-23

Генеральный директор
АО «ФПК ФармВИЛАР»



И.В. Воскобойникова