

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФРАМИЦЕТИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ФРАМИЦЕТИН

Международное непатентованное или группировочное наименование: Фрамицетин

Лекарственная форма: Спрей назальный

Состав на 100 мл:

Действующее вещество:

Фрамицетина сульфат - 1,25 г

что соответствует 800 000 ЕД

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, натрия хлорид, натрия цитрат, лимонной кислоты моногидрат, вода очищенная.

Описание: Прозрачная бесцветная или практически бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: Антибиотик из группы аминогликозидов.

Код АТХ: R01AX08.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Антибиотик из группы аминогликозидов для местного применения в отоларинтологии. Действует бактерицидно. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumonia*, *Haemophilus influenza*), вызывающих развитие инфекционных процессов в верхних отделах дыхательных путей.

Показания к применению:

В составе комбинированной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, в т.ч.:

- риниты;
- ринофарингиты;
- синуситы (при отсутствии повреждений перегородок).

Профилактика и лечение воспалительных процессов после оперативных вмешательств.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к фрамицетину и другим антибиотикам из группы

аминогликозидов. Препарат не следует применять для промывания придаточных пазух носа. Беременность и период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы:

Интраназально.

Взрослым: по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 4-6 раз в сутки.

Детям: по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза в сутки.

Длительность лечения – не более 7 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания:

Следует помнить, что при лечении возможно появление резистентных штаммов микроорганизмов.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Не влияет.

Форма выпуска:

Спрей назальный, 1,25 %.

По 10, 15, 20, 25 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокого давления, укупоренные дозатором-спреем полимерным из полиэтилена высокого давления и крышкой полимерной или колпачком полимерным из полиэтилена низкого давления.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац.

Допускается упаковка флаконов без пачки по 30, 50, 120 и 150 штук вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (для стационаров).

На каждый флакон, групповую упаковку наклеивают этикетку из бумаги писчей или этикеточной или самоклеящуюся этикетку.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ», Россия, 117218, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 25, офис 5 этаж.

Организация, принимающая претензии:

ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86.
Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Производитель:

ОАО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б.

Генеральный директор
ООО «ВЕСТ»



К.Г. Торгомян

13 1638

