

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Геделикс® Кирш**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:**

Геделикс® Кирш

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

плюща обыкновенного листьев экстракт

**Лекарственная форма:**

сироп со вкусом вишни и малины

**Состав (на 100 мл препарата):**

*Активный компонент:*

Плюща обыкновенного листьев экстракт сухой (4 - 8 : 1) – 700,0 мг.

*Вспомогательные вещества:*

калия сорбат, камедь ксантановая, мальтитол жидкий, лимонная кислота безводная, ароматизатор вишневый, ароматизатор малиновый, вода очищенная.

**Описание**

Прозрачный или непрозрачный желтовато-коричневый раствор с фруктовым запахом.

Возможно появление осадка, который исчезает при взбалтывании флакона.

**Фармакотерапевтическая группа**

Отхаркивающее средство растительного происхождения

**Код АТХ**

R05CA

## **Фармакологическое действие**

### ***Фармакодинамика***

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхоспазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

### ***Фармакокинетика***

Активным компонентом препарата является сухой экстракт листьев плюща обыкновенного, содержащий сложный комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

### **Показания к применению**

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к активному компоненту, к растениям семейства Аралиевых (Araliaceae) или к любому из вспомогательных веществ.

Наследственная непереносимость фруктозы; беременность, период грудного вскармливания.

### **С осторожностью**

Применять с осторожностью у пациентов с гастритом или язвенной болезнью желудка; у пациентов с приступами затрудненного дыхания, гнойной мокротой, мокротой с прожилками крови.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Препарат Геделикс® Кирш сироп со вкусом вишни и малины не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Препарат Геделикс® Кирш следует принимать внутрь (после еды).

В упаковке препарата на 100 мл находится мерный шприц.

1 мерный шприц соответствует 5 мл.

Использование мерного шприца:

Плотно вставить мерный шприц в горлышко флакона. Перевернуть флакон вверх дном и плавно потянуть поршень вниз, набирая сироп в шприц до нужной отметки. Вернуть флакон в исходное положение и вынуть шприц, аккуратно поворачивая его. Содержимое шприца может быть помещено непосредственно в ротовую полость или перемещено в ложку. После употребления промыть шприц и высушить его.

Если врач не назначил другой режим дозирования, следует придерживаться следующих режимов дозирования:

Дети от 0 до 1 года – 2,5 мл 1 раз в день.

Дети от 1 до 6 лет – 2,5 мл 2 раза в день.

Дети от 6 до 10 лет – 5 мл 2 раза в день.

Взрослые и дети старше 10 лет – 5 мл 3 раза в день.

Перед применением тщательно взболтать флакон.

Взрослым и подросткам препарат Геделикс® Кирш рекомендуется применять неразбавленным. Грудным и маленьким детям рекомендуется давать разбавленным в небольшом количестве воды.

В период лечения препаратом рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости в теплом виде (вода, чай и др.). Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения составляет 7 дней. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов заболевания продолжить терапию еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния пациента необходимо обратиться к врачу. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, в редких случаях – боли в эпигастральной области.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

Прием дозы, значительно превышающей рекомендованные суточные дозы (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту, диарею.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

### **Особые указания**

При отсутствии терапевтического эффекта на фоне лечения препаратом в течение 7 дней или ухудшения состояния (появление приступов удушья, гнойной или кровавой мокроты при откашливании, повышение температуры) необходимо обратиться к врачу.

Указания для пациентов с сахарным диабетом:

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что 5 мл препарата соответствует 0,23 хлебных единиц (ХЕ).

### **Влияние на способность к управлению транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

### **Форма выпуска**

Сироп со вкусом вишни и малины.

По 100 мл во флаконы темного стекла с пробкой из полиэтилена низкой плотности с отверстием под мерный шприц, который состоит из корпуса из полипропилена и поршня из полиэтилена высокой плотности.

Каждый флакон закрывают крышкой с кольцом для контроля первого вскрытия и вместе с инструкцией по применению и мерным шприцем с делениями помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Срок хранения после первого вскрытия флакона 6 месяцев.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта

### **Владелец регистрационного удостоверения**

Кревель Мойзельбах ГмбХ

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия

### **Производитель**

Кревель Мойзельбах ГмбХ

### ***Юридический адрес***

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия

### ***Место производства***

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия

### **Организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «Кревель Мойзельбах», Россия

115114, г. Москва, ул. Летниковская д. 10, строение 4, этаж 7, пом. I, комн. 39Г

Тел.: +7 (495) 966 00 94

Генеральный Директор  
ООО «Кревель Мойзельбах»



Ф.Х. Дизингер

***Примечания, которые не печатаются в инструкции по медицинскому применению:***

1. Фраза «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» не печатается в инструкции при производстве.
2. На немецком языке при производстве может быть указан логотип производителя.
3. При производстве возможно наличие цифро-буквенного (на латинице) индивидуального кода продукта; типографского кода автоматической идентификации упаковочного материала для внутреннего пользования; допускается нанесение дополнительных технологических кодов и меток.