

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

Глюкозамина сульфат 750

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Глюкозамина сульфат 750

Международное непатентованное или группировочное название: Глюкозамин

Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой

СОСТАВ: одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:

Активное действующее вещество:

Глюкозамина сульфата калия хлорид в пересчете на глюкозамина сульфат – 750 мг

Вспомогательные вещества: кальция карбонат, целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, кроскармеллоза натрия.

Оболочка: гипромеллоза, титана диоксид, триацетин, пропиленгликоль, краситель солнечный закат желтый (E110).

ОПИСАНИЕ

Двойковыпуклые таблетки овальной формы, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до темно-желтого цвета, с гравировкой «GS 750» с одной стороны таблетки.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Репарации тканей стимулятор.

КОД АТХ: [M01AX05]

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Глюкозамин способствует предотвращению процессов разрушения хряща, стимулирует восстановление хрящевой ткани, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, нормализует продукцию внутрисуставной жидкости. Улучшает подвижность суставов, уменьшает потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Остеоартроз периферических суставов и позвоночника.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость, выраженное нарушение функции почек, беременность, период лактации. Данных по применению препарата у детей нет.

С осторожностью: бронхиальная астма, сахарный диабет, непереносимость морепродуктов (креветки, моллюски).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь. Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день.

Устойчивый лечебный эффект достигается при приеме препарата в течение 6 месяцев.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Нарушения функции желудочно-кишечного тракта (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор, тошнота), кожные аллергические реакции (крапивница, зуд кожи).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы: случаи передозировки неизвестны. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Повышает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола. Препарат совместим с парацетамолом, НПВП и глюкокортикостероидами. При совместном применении с НПВП усиливает противовоспалительный и обезболивающий эффект последних.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не рекомендуется принимать детям до 18 лет из-за отсутствия научных данных для этой категории пациентов. Риск аллергических реакций возрастает при непереносимости морепродуктов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки покрытые пленочной оболочкой 750 мг

По 60 таблеток в полиэтиленовом флаконе с завинчивающейся полиэтиленовой крышкой и предохранительным клапаном из фольги. На флакон наклеивают этикетку, флакон с крышкой затягивают полиэтиленовой пленкой и вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

По 15 таблеток в блистере из алюминиевой фольги/ПВХ. 4 или 8 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом месте, при температуре 10-30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Не использовать по окончании срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Юнифарм, Инк., США

Претензии направлять в адрес:

Представительство в России: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.1,
тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru

Представитель фирмы:



А.М. КРЫЛОВА

Инструкция по медицинскому применению препарата

Глюкозамина сульфат 750
таблетки покрытые пленочной оболочкой

«Юнифарм, Инк», США

Изменение № 1

Срок введения изменений с "04" 08 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Представительство в России: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1, тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru	Представительство в России: 113114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 5, тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru

Представитель фирмы



А.М. Крылова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Глюкозамина сульфат 750Таблетки покрытые пленочной оболочкойЮНИФАРМ, Инк., США

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 06 12 12 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>СОСТАВ: одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит</p> <p><i>Активное действующее вещество:</i></p> <p>Глюкозамина сульфата калия хлорид в пересчете на глюкозамина сульфат – 750 мг</p> <p><u>Вспомогательные вещества:</u> кальция карбонат, целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, кроскармеллоза натрия.</p> <p><u>Оболочка:</u> гипромеллоза, титана диоксид, триацетин, пропиленгликоль, краситель солнечный закат желтый (E110).</p>	<p>СОСТАВ: одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит</p> <p><i>Активное действующее вещество:</i></p> <p>Глюкозамина сульфата калия хлорид в пересчете на глюкозамина сульфат – 750 мг</p> <p><u>Вспомогательные вещества:</u> кальция карбонат – 455,00 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 60,00 мг, стеариновая кислота – 45,00 мг, кремния диоксид коллоидный – 22,50 мг, магния стеарат – 15,00 мг, кроскармеллоза натрия – 15,00 мг.</p> <p><u>Оболочка:</u> гипромеллоза – 20,00 мг, титана диоксид – 14,30 мг, триацетин – 2,50 мг, пропиленгликоль – 2,50 мг, краситель солнечный закат желтый (E110) – 0,70 мг.</p>
<p>ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ</p> <p>Индивидуальная непереносимость, выраженное нарушение функции почек, беременность, период лактации. Данных по применению препарата у детей нет.</p> <p><i>С осторожностью:</i> бронхиальная астма, сахарный диабет, непереносимость морепродуктов (креветки, моллюски).</p>	<p>ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ</p> <p>Индивидуальная непереносимость, выраженное нарушение функции почек. Детский возраст до 18 лет.</p>
<p>ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ</p> <p>Не рекомендуется принимать детям до 18 лет из-за отсутствия научных данных для этой категории пациентов. Риск аллергических реакций возрастает при непереносимости морепродуктов.</p>	<p>ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ</p> <p><i>С осторожностью:</i> бронхиальная астма, сахарный диабет, непереносимость морепродуктов (креветки, моллюски).</p>

Изменение №2 к Инструкции по применению лекарственного препарата С. 2


-	<p>УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ, ЖЕНЩИНАМИ В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЬМИ, ВЗРОСЛЫМИ, ИМЕЮЩИМИ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ</p> <p>В период беременности и грудного вскармливания прием препарата противопоказан.</p>
-	<p>СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ВЛИЯНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ</p> <p>Нет данных.</p>
<p>Представительство в России: 113114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 5, тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru</p>	<p>Представительство в России: 115998, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru</p>

Представитель фирмы



ПОДПИСЬ

А.М. Крылова



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 15968/01-230115
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Глюкозамина сульфат 750
Таблетки покрытые пленочной оболочкой
ЮНИФАРМ, Инк., США

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» 23 01 15 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Претензии направлять в адрес: Представительство в России: 115998, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru	Претензии направлять в адрес: Представительство в России: 115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Тел: +7(495) 995-77-67, www.unipharm.ru

Представитель фирмы



Крылова А.М.