

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВРОССИИ  
ЛП - 006374-280720  
СОГЛАСОВАНО

**Ингалипт**

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование препарата**

Ингалипт

**Международное непатентованное или группировочное наименование**

«Месульфамид + Мята перечной листьев масло + Сульфатиазол + Тимол + Эвкалипта  
прутовидного листьев масло

**Лекарственная форма**

Аэрозоль для местного применения

**Состав:**

1 баллон 30 или 45 мл содержит:

*Действующие вещества:*

Месульфамид (стрептоцид растворимый)	- 0,750 г	1,125 г
Сульфатиазол натрия пентагидрат (в пересчете на сульфатиазол натрия)	- 0,750 г - 0,540 г	1,125 г 0,810 г
Тимол	- 0,015 г	0,0225 г
Эвкалипта прутовидного листьев масло	- 0,015 г	0,0225 г
Мята перечной листьев масло	- 0,015 г	0,0225 г
<i>Вспомогательные вещества:</i>		
Этанол (спирт этиловый) 95%	- 1,8 г	2,7 г
Сахароза	- 1,5 г	2,25 г
Глицерол	- 2,1 г	3,15 г
Полисорбат-80 (Твин-80)	- 0,9 г	1,35 г
Вода очищенная	- до 30 мл	до 45 мл
Азот	от 0,3 до 0,4 г	от 0,45 до 0,6 г

**Описание**

Жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом тимола и ментола.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противомикробное средство комбинированное.

**Код АТХ: R02AA20**

### **Фармакологические свойства**

#### *Фармакодинамика*

Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки).

Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

#### *Фармакокинетика*

Препарат образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты, которые связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на 12-14 %, сульфатиазол натрия на 55 %. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида составляет 10 час, сульфатиазола натрия — 1-2 час.

### **Показания к применению**

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 3-х лет) беременность, период грудного вскармливания, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказано применение препарата Ингалипт при беременности и в период грудного вскармливания. В состав препарата входят сульфаниламиды, которые проникают через плаценту и обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия. При необходимости использования препарата в период грудного вскармливания необходимо прекратить грудное вскармливание, т.к. сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

### **Способ применения и дозы**

Применяется местно. Сняв предохранительный колпачок с баллона и надев прилагаемый распылитель, распыляют взвесь в полость рта в течение 1-2 секунд. Препарат удерживают в полости рта 5-7 минут. Орошение производят 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Во избежание снижения эффективности препарата рекомендуется воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 30 мин после орошения.

Курс лечения не более 7 дней.

#### **Побочное действие**

Аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения или першения в горле. При появлении побочных реакций необходимо отменить применение препарата и обратиться к врачу.

#### **Передозировка**

Симптомы: тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение: специфический антидот отсутствует, проводятся симптоматическая и поддерживающая терапия.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Совместим с другими лекарственными препаратами, данные о клинически значимых взаимодействиях отсутствуют.

#### **Особые указания**

Применение препарата Ингалипт у детей возможно только по рекомендации врача!

Баллон не вскрывать и не нагревать. Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

Лекарственный препарат содержит этанол 95 % (1,8 г/30 мл и 2,7 г/45 мл). Лекарственный препарат содержит сахарозу (1,5 г/30 мл и 2,25 г/45 мл), что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Ингалипт не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

#### **Форма выпуска**

Аэрозоль для местного применения.

По 30 или 45 мл в баллонах аэрозольных алюминиевых с клапанами нажимными, распылительной насадкой с предохранительным колпачком.

На каждый баллон, коробку наклеивают этикетку из бумаги писчей или этикеточной или самоклеющуюся этикетку.

Допускается нанесение информации, указанной на этикетке первичной упаковки, непосредственно на баллон методом напыления.

Каждый баллон и инструкцию по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте

**Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии:**

ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

**Производитель**

ОАО «Самарамедпром», Россия, 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б.

Тел./факс (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Начальник ОРФИС

ОАО «Самарамедпром»



В.А. Ермохин