

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
КАМФОРНОЕ МАСЛО

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование**  
КАМФОРНОЕ МАСЛО

**Международное непатентованное или группировочное наименование**  
Камфора

**Лекарственная форма**  
Раствор для наружного применения масляный

**Состав на 1 л:**  
*Действующее вещество:* камфора рацемическая -100 г  
*Вспомогательное вещество:* подсолнечное масло – до 1 л.

**Описание.**  
Прозрачная маслянистая жидкость желтого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**  
Местнораздражающее средство

**Код АТХ:** M02AX10

**Фармакологические свойства**  
Препарат оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

### **Фармакокинетика.**

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками, часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

### **Показания для применения**

Артралгия, миалгия, ишиас, миозит, профилактика образования пролежней.

### **Противопоказания для применения**

Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема), беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

### **Способ применения и дозы**

Наружно. Миалгия, миозит, артралгия, ишиас: небольшое количество масла наносят на область болевых ощущений и легкими движениями растирают. Применяют 2-3 раза в день в течение 7-10 дней. Профилактика образования пролежней: обработка кожных покровов 2-3 раза в день.

### **Побочные действия**

Аллергические кожные реакции (крапивница), раздражение кожи, головная боль, головокружение.

### **Передозировка**

Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги.

Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не изучалось.

### **Особые указания**

Следует избегать попадания препарата на открытые раны, в глаза и слизистые оболочки. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими

повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций из-за возможного возникновения побочного эффекта – головокружения.

#### **Форма выпуска**

Раствор для наружного применения масляный 10 %.

По 30, 50 или 100 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

На флаконы наклеивают этикетки.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Формула-ФР»

Россия, 109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 139, офис 10

#### **Производитель**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

#### **Организация, принимающая претензии потребителя**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872)41-04-73

Директор

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»



Л.Я. Рабинович