

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАМФОРНЫЙ СПИРТ

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП - 006189-270420

СОГЛАСОВАНО

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование**

Камфорный спирт

**Международное непатентованное или группировочное наименование**

Камфора

**Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения спиртовой

**Состав на 100 мл:**

*Действующее вещество:* камфора – 10 г

*Вспомогательное вещество:* этанол (этиловый спирт) 70 % – до 100 мл.

**Описание.**

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**

Местнораздражающее средство растительного происхождения

**Код АТХ: M02AX10**

**Фармакологические свойства**

Лекарственное средство природного происхождения, оказывает местнораздражающее, антисептическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Возбуждает чувствительные нервные окончания, рефлекторно улучшает трофику органов и тканей.

### **Фармакокинетика**

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

### **Показания к применению**

Миалгия, миозит, артралгия, ишиас, профилактика образования пролежней.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема), беременность, период лактации, детский возраст (в связи с отсутствием данных).

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Перед применением препарата Камфорный спирт, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Наружно. Миалгия, миозит, артралгия, ишиас: наносят на кожу над пораженной областью 2-3 раза в день. Продолжительность лечения 7-10 суток.

Профилактика образования пролежней: обработка кожных покровов 2-3 раза в день.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции (крапивница), раздражение кожи, головная боль, головокружение.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги.

Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не изучалось.

### **Особые указания**

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспаленные участки кожи. После применения препарата необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании препарата в рот или нос необходимо тщательно промыть их водой.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияние на выполнение опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

### **Форма выпуска**

Раствор для наружного применения спиртовой 10%.

По 40 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми с уплотнительными элементами и навинчиваемыми крышками.

Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Формула-ФР»

Россия, 109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 139, офис 10

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872)41-04-73

 Директор

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»



Л.Я. Рабинович