

**ИНСТРУКЦИЯ**  
(информация для специалистов)  
по медицинскому применению препарата  
**ПИПЕРАЗИН**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Пиперазин

**МНН:** пиперазина адипат.

**Химическое название:** гексагидропиразина адипинат

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав.** Каждая таблетка содержит пиперазина адипината 0,2 г или 0,5 г, а также вспомогательные вещества: тальк, крахмал картофельный, желатин медицинский.

**Описание.** Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.

**Фармакотерапевтическая группа:** противогельминтное средство.

**Код АТХ :** [P02CB01].

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*

Оказывает парализующее действие на нематод (аскариды, острицы), нарушая функцию их перво-мышечной системы, вызывает паралич мускулатуры. Выраженность дегельминтизации препаратом находится на уровне 90-95%, а при повторном применении может составить около 100%. Ввиду того, что пиперазин не уничтожает аскарид, отсутствует опасность всасывания биологических токсических продуктов их распада. Препарат малотоксичен.

*Фармакокинетика*

Препарат быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Выводится из организма в основном почками.

**Показания к применению:** аскаридоз и энтеробиоз.

**Способ применения и дозы**

Внутрь. При лечении аскаридоза препарат назначают в течение двух дней подряд по 2 раза в день за 1 час до или 0,5-1 час после еды в следующих дозах:

взрослым и детям от 15 лет – 1,5 г – 2,0 г; детям в возрасте до 1 года – 0,2 г (суточная доза 0,4 г), от 1 до 3 лет – по 0,3 г (суточная доза 0,6 г), от 3 до 5 лет – 0,5 г (суточная доза 1,0 г), от 5 до 8 лет – 0,75 г (суточная доза 1,5 г), от 8 до 12 лет – 1,0 г (суточная доза 2,0 г), от 13 до 15 лет – 1,5 г (суточная доза 3,0 г).

Возможно применение препарата в течение одного дня однократно в дозе от 0,4\* до 4,0 г в зависимости от возраста. Максимальная суточная доза у взрослых 4 г.

При энтеробиозе в тех же дозах препарат назначают в течение 5 дней подряд (проводят 1-3 курса терапии с 7-дневным перерывом между курсами) или в течение одного дня однократно в дозе от 0,4 до 4 г в зависимости от возраста. В перерывах между циклами назначается клизма на ночь для механического вымывания остриц (взрослым 4-5 стаканов воды, детям 1-2 стакана с добавлением натрия бикарбоната 1/2 чайной ложки на стакан воды).

### **Побочное действие**

Редко наблюдается тошнота, абдоминальные боли, головная боль, которые быстро исчезают. У больных с почечной недостаточностью могут наблюдаться нейротоксические осложнения (мышечная слабость, тремор, эйфория, галлюцинации, ухудшение зрения, нарушение координации движений).

### **Противопоказания**

Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период лактации.

### **Передозировка**

При передозировке наблюдаются невыраженные мышечная слабость, тремор, нейротоксические явления, особенно у больных с нарушениями выделительной функции почек. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов — активированного угля), симптоматическое лечение. При необходимости проводят оксигено- и трансфузионную терапию. При неврологических симптомах вводят тиамин.

### **Особые указания**

Предварительной подготовки больных не требуется. При проведении лечения необходимо строгое соблюдение гигиенического режима. Слабительные средства назначают только пациентам со склонностью к запорам вечером (в дни приема пиперазина). Безопасность применения препарата при беременности и лактации не установлена.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Усиливает выраженность экстрапирамидных нарушений, вызываемых хлорпромазином.

### **Форма выпуска**

Таблетки по 0,2 г или 0,5 г пиперазина адипината. По 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке. По 30, 50 или 100 таблеток в банке полимерной. 1, 2, 3 или 5 контурных упаковок или банку полимерную вместе с инструкцией по применению в пачке.

**Срок годности** 5 лет. По истечении срока годности препарат применять не следует.

### **Условия хранения**

Список Б. В сухом месте, недоступном для детей, при температуре не выше 25 °С.

### **Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

### **Производитель**

ОАО «Фармстандарт - Лексредства» Курск, ул.2-я Агрегатная, 1а/18;  
тел/факс: (07122) 6-14-65

Директор ИДКЭЛС, профессор



В.В. Чельцов

Представитель  
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Е.В. Толстова

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ**

**ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению**

**Пиперазин таблетки 0,5 г**


Регистрационный номер: ЛС-002525

Изменение № 1

Срок введения изменений с «11» 08 2008

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>ФОРМА ВЫПУСКА</b></p> <p>Таблетки 0,2 и 0,5 г.</p> <p>По 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке.</p> <p>По 30, 50 или 100 таблеток в банке полимерной.</p> <p>1, 2, 3 или 5 контурных упаковок или банку полимерную вместе с инструкцией по применению помещают в пачке.</p>	<p><b>ФОРМА ВЫПУСКА</b></p> <p>Таблетки 0,5 г.</p> <p>По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку.</p> <p>По 30, 50 или 100 таблеток в банке полимерной.</p> <p>1, 2, 3 или 5 контурных упаковок или банку полимерную вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.</p> <p>Допускается контурные ячейковые или безъячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению помещать в групповую упаковку.</p>

Представитель  
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»



Е.В. Ежикова



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пиперазин  
таблетки 0,5 г


ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « \_\_\_ » 220811 20\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Условия хранения</b> Список Б. В сухом месте, недоступном для детей, при температуре не выше 25 °С.</p> <p><b>Производитель</b> ОАО «Фармстандарт - Лексредства», 305909, Курск, ул.2-я Агрегатная , 1а/18; тел/факс: (07122) 6-14-65</p>	<p><b>Условия хранения</b> Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p><b>Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии</b> ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru</p>

Представитель  
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»



Е.В. Толстова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пиперазин  
таблетки, 0,5 г

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « 14 02 12 20   г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Состав.</b> Каждая таблетка содержит пиперазина адипината 0,2 г или 0,5 г, а также вспомогательные вещества: тальк, крахмал картофельный, желатин медицинский.</p>	<p><b>Состав на одну таблетку</b> <i>Активное вещество:</i> пиперазина адипат (пиперазина адипинат) - 0,5 г; <i>вспомогательные вещества:</i> тальк, крахмал картофельный, желатин медицинский.</p>
<p><b>Способ применения и дозы</b> Внутрь. При лечении аскаридоза препарат назначают в течение двух дней подряд по 2 раза в день за 1 час до или 0,5-1 час после еды в следующих дозах: взрослым и детям от 15 лет – 1,5 г – 2,0 г; детям в возрасте-до 1 года – 0,2 г (суточная доза 0,4 г), от 1 до 3 лет – по 0,3 г (суточная доза 0,6 г), от 3 до 5 лет – 0,5 г (суточная доза 1,0 г), от 5 до 8 лет – 0,75 г (суточная доза 1,5 г), от 8 до 12 лет – 1,0 г (суточная доза 2,0 г), от 13 до 15 лет – 1,5 г (суточная доза 3,0 г).</p>	<p><b>Способ применения и дозы</b> Внутрь. При лечении аскаридоза препарат назначают в течение двух дней подряд по 2 раза в день за 1 час до или 0,5-1 час после еды в следующих дозах: взрослым и детям от 15 лет – 1,5 г – 2,0 г; детям в возрасте от 3 до 5 лет – 0,5 г (суточная доза 1,0 г), от 5 до 8 лет – 0,75 г (суточная доза 1,5 г), от 8 до 12 лет – 1,0 г (суточная доза 2,0 г), от 13 до 15 лет – 1,5 г (суточная доза 3,0 г). Возможно применение препарата в течение одного дня однократно в дозе от 0,5 г до 4,0 г в зависимости от возраста.</p>

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<p>Возможно применение препарата в течение одного дня однократно в дозе от 0,4 до 4,0 г в зависимости от возраста.</p> <p>Максимальная суточная доза у взрослых 4 г.</p> <p>При энтеробиозе в тех же дозах препарат назначают в течение 5 дней подряд (проводят 1-3 курса терапии с 7-дневным перерывом между курсами) или в течение одного дня однократно в дозе от 0,4 до 4 г в зависимости от возраста. В перерывах между циклами назначается клизма на ночь для механического вымывания остриц (взрослым 4-5 стаканов воды, детям 1-2 стакана с добавлением натрия бикарбоната 1/2 чайной ложки на стакан воды).</p> <p><b>Противопоказания</b></p> <p>Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период лактации.</p> <p><b>Особые указания</b></p> <p>(далее по тексту)</p> <p><b>Раздел отсутствует</b></p>	<p>Максимальная суточная доза у взрослых 4,0 г.</p> <p>При энтеробиозе в тех же дозах препарат назначают в течение 5 дней подряд (проводят 1-3 курса терапии с 7-дневным перерывом между курсами) или в течение одного дня однократно в дозе от 0,5 г до 4,0 г в зависимости от возраста. В перерывах между циклами назначается клизма на ночь для механического вымывания остриц (взрослым 4-5 стаканов воды, детям 1-2 стакана с добавлением 1/2 чайной ложки натрия бикарбоната на стакан воды).</p> <p><b>Противопоказания</b></p> <p>Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период лактации. Детский возраст до 3 лет (для данной дозировки).</p> <p><b>Особые указания</b></p> <p>(далее по тексту)</p> <p><b>Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами</b></p> <p>Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и различными механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными</p>

Старая редакция	Новая редакция
<b>Взаимодействие с другими лекарственными средствами</b> (далее по тексту)	видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций. <b>Взаимодействие с другими лекарственными средствами</b> (далее по тексту)

Представитель  
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»



Е.В. Толстова

МИНЗДРАВ РОССИИ  
 ДС-002525- 06 03 14  
 СОГЛАСОВАНО

**ИНСТРУКЦИЯ**  
 по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пиперазин  
 таблетки, 0,5 г

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « 06 03 14 » 20   г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>МНН:</b> пиперазина адипат.</p> <p><b>Состав на одну таблетку</b>  <i>Активное вещество:</i> пиперазина адипат (пиперазина адипинат) - 0,5 г;  <i>вспомогательные вещества:</i> тальк, крахмал картофельный, желатин медицинский.</p> <p><b>Условия отпуска из аптек</b>                      По рецепту.</p>	<p><b>МНН:</b> пиперазина адипинат</p> <p><b>Состав на одну таблетку</b>  <i>Активное вещество:</i> пиперазина адипинат – 0,5 г;  <i>вспомогательные вещества:</i> крахмал картофельный – 0,077 г, тальк – 0,018 г, желатин (желатин медицинский) – 0,005 г.</p> <p><b>Условия отпуска</b>                      По рецепту.</p>

Представитель  
 ОАО "Фармстандарт-Лексредства"




Е.В. Толстова

МЗ РФ  
 ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ  
 ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ  
 ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА  
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

83072



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ



по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пиперазин  
таблетки, 500 мг

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения « 30 » 01 2019 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>ИНСТРУКЦИЯ</b></p> <p>по применению лекарственного препарата для медицинского применения</p> <p>Пиперазин</p> <p><b>Торговое название препарата:</b> Пиперазин</p> <p><b>МНН:</b> пиперазина адипинат</p> <p><b>Химическое название:</b> гексагидропиразина адипинат</p> <p><b>Состав на одну таблетку</b> <i>Активное вещество:</i> пиперазина адипинат – 0,5 г; <i>вспомогательные вещества:</i> крахмал картофельный – 0,077 г, тальк – 0,018 г,</p>	<p><b>ИНСТРУКЦИЯ</b></p> <p><b>ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ</b> <b>ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА</b></p> <p>Пиперазин</p> <p><b>Торговое наименование:</b> Пиперазин</p> <p><b>Международное непатентованное или группировочное наименование:</b> Пиперазина адипинат</p> <p><b>Химическое наименование:</b> гексагидропиразина адипинат</p> <p><b>Состав на одну таблетку</b> <i>Действующее вещество:</i> пиперазина адипинат – 500,0 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> крахмал картофельный – 77,0 мг, тальк – 18,0 мг,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>желатин (желатин медицинский) – 0,005 г.</p> <p><b>Описание.</b> Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.</p> <p><b>Противопоказания</b> Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период лактации. Детский возраст до 3 лет (для данной дозировки).</p> <p><b>Раздел отсутствует</b></p> <p><b>ФОРМА ВЫПУСКА</b> Таблетки 0,5 г. По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку. По 30, 50 или 100 таблеток в банке полимерной. 1, 2, 3 или 5 контурных упаковок или банку полимерную вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.</p>	<p>желатин – 5,0 мг.</p> <p><b>Описание.</b> Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого цвета, с фаской и риской.</p> <p><b>Противопоказания</b> Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст до 3 лет (для данной дозировки).</p> <p><b>Применение при беременности и в период грудного вскармливания</b> Применение препарата Пиперазин противопоказано при беременности. При необходимости назначения препарата в период грудного вскармливания кормление грудью следует прекратить.</p> <p><b>Форма выпуска</b> Таблетки, 0,5 г. По 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или светозащитной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 30, 50 или 100 таблеток в банки полимерные для хранения лекарственных средств и витаминов с крышками из</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Допускается контурные ячейковые или безъячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению помещать в групповую упаковку.</p>	<p>полиэтилена высокого давления с контролем или без контроля вскрытия. 1, 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок или 1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается контурные ячейковые упаковки помещать в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению.</p>
<p><b>Срок годности</b> 5 лет. По истечении срока годности препарат применять не следует.</p>	<p><b>Срок годности</b> 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.</p>
<p><b>Условия отпуска</b> По рецепту.</p>	<p><b>Условия отпуска</b> Отпускают по рецепту.</p>
<p><b>Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии</b> ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13 www.pharmstd.ru</p>	<p><b>Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии:</b> ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru</p>

Представитель  
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»



С.В. Барыкин