

**Листок-вкладыш – информация для пациента****Уропрост, 10 мг, суппозитории ректальные**

Действующее вещество: простаты экстракт

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки. Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша. Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 10-15 дней, Вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Уропрост, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Уропрост.
3. Применение препарата Уропрост.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Уропрост.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Уропрост, и для чего его применяют.**

Препарат Уропрост содержит действующее вещество простаты экстракт, относится к средствам, применяемым в урологии.

Биологически активные вещества экстракта простаты относят к группе пептидных (белковых) биорегуляторов.

**Показания к применению**

Препарат предназначен для применения у взрослых мужчин в возрасте от 18 лет.

Хронический простатит, состояние до и после операций на предстательной железе, доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

**Способ действия препарата Уропрост**

Препарат обладает противовоспалительным и антиагрегационным действием, стимулирует мышцы мочевого пузыря. В основе применения пептидных биорегуляторов при лечении хронического простатита лежит способность этих препаратов восстанавливать

микроциркуляцию, оказывать непрямое противовоспалительное действие за счет усиления синтеза антигистаминовых и антисеротониновых антител, а также их иммуномодулирующее и иммуностимулирующее действие. Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы основано на органотропности (избирательного воздействия на функции клеток того органа, из которого они выделены) пептидных биорегуляторов экстракта предстательной железы.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 10-15 дней, Вам следует обратиться к врачу.

## **2. О чём следует знать перед применением препарата Уропрост.**

### **Противопоказания**

**Не применяйте препарат Уропрост, если у Вас:**

Аллергия на экстракт простаты или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Уропрост проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим применение различных групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения. При лечении рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

### **Дети и подростки**

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности, поскольку эффективность и безопасность не установлены.

### **Другие препараты и препарат Уропрост**

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или, можете начать применять какие-либо другие препараты.

Препарат может использоваться в комплексной терапии. Случай взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

### **Беременность, грудное вскармливание**

Препарат не предназначен к применению у женщин.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### 3. Применение препарата Уропрост.

Всегда применяйте препарат Уропрост в полном соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача или работника аптеки. Если Вы не уверены, посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом или работником аптеки.

- Рекомендуемая доза препарата Уропрост – 1 суппозиторий 1 раз в день.

#### Путь и (или) способ введения

Препарат применяют ректально. Освободив суппозиторий от контурной упаковки, вводят его в задний проход после дефекации или очистительной клизмы.

После введения препарата желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 мин. Длительность лечения 20 дней. По рекомендации врача возможно проведение повторных курсов лечения, но не ранее, чем через 2-4 недели после окончания терапии.

#### Если Вы применили препарата Уропрост больше, чем следовало

До настоящего времени случаи передозировки препарата не зарегистрированы.

#### Если Вы забыли применить препарат Уропрост

Если Вы пропустили применение суппозитория, примените его как можно быстрее. Если подошло время применения следующего суппозитория, примените его как обычно.

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенный суппозиторий, так как это может повысить вероятность появления нежелательных реакций.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

### 4. Возможные нежелательные реакции.

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

#### Резюме нежелательных реакций

Классификация частоты развития побочных эффектов, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): очень часто ( $1>10$ ); часто ( $1>100, \leq 1/10$ ), нечасто ( $1>1000, \leq 1/100$ ), редко ( $1>10000, \leq 1/1000$ ), очень редко (менее  $1/10000$ ), частота неизвестна (не может быть установлена по имеющимся данным)

Очень редко – аллергические реакции, часто – зуд в заднем проходе, нечасто – диарея, метеоризм.

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Федеральная служба в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: (495) 698-45-38, (499) 578-02-30

Факс: (495) 698-15-73

[pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
<https://roszdravnadzor.gov.ru/>

## **5. Хранение препарата Уропрост.**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срок хранения), указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения.**

### **Препарат Уропрост содержит**

Действующее вещество: простаты экстракт

Каждый суппозиторий содержит: 10 мг простаты экстракта, в пересчете на водорастворимые пептиды (субстанция «Сампрост», Простаты экстракт).

Прочим вспомогательным веществом является: жирных кислот глицериды (Витепсол W35) – до получения суппозитория массой 1,0 г.

### **Внешний вид препарата Уропрост и содержимое упаковки**

Суппозитории ректальные.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 03.07.2023 № 12370  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Суппозитории от белого до желтовато-серого или серого цвета, горпедообразной формы.

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной.

По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке картонной.

**Держатель регистрационного удостоверения**

АО «Патент-Фарм», Россия

199106, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.75, литер Б, пом. 208

Телефон/факс: (812) 380-14-14

**Производитель**

ООО «Альтфарм»

142073, Россия, Московская область, г. Домодедово, д. Судаково, территория вл. Лесное,  
стр. 10б.

Телефон/факс: (495)234-46-40

[info@altparm.ru](mailto:info@altparm.ru)

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий  
следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного  
удостоверения**

ООО «Фармацевтические технологии», Россия

199106, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.75, литер Б, пом. 209

Телефон/факс: (812) 380-14-14

[info@pharmatech.spb.ru](mailto:info@pharmatech.spb.ru)

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза:

<http://eec.eaeunion.org/>