

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО**

Регистрационный номер:

Торговое наименование

Вазелиновое масло

Международное непатентованное или группировочное название

Парафин жидкий

Лекарственная форма

Масло для приема внутрь

Состав:

парафин жидкий (вазелиновое масло).

Описание

Бесцветная маслянистая нефлуоресцирующая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительное средство

Код АТХ: А06АА01.

Фармакологические свойства

Размягчает каловые массы; оказывает слабое стимулирующее действие на моторику кишечника. При приеме внутрь не всасывается. Слабительный эффект наступает через 6-8 ч.

Показания к применению

Запор.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, острые воспалительные процессы в брюшной полости, кишечная непроходимость, кишечное кровотечение, лихорадочный синдром, беременность.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности применение препарата противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. В период грудного вскармливания – возможно.

Способ применения и дозы

Внутри по 1-2 столовые ложки в день через 2 ч после приема пищи. Курс лечения – не более 5 дней.

Если после лечения улучшения не наступает, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата. Вы должны обратиться к врачу, если симптомы ухудшаются или не улучшаются после 2-3 дней лечения.

Побочное действие

При длительном применении – нарушение процесса пищеварения, атония кишечника, гиповитаминозы А, Е, К.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного баланса.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Нет данных.

Особые указания

Применение препарата у беременных противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки. При приеме внутрь вазелиновое масло может пройти через анальный сфинктер и загрязнить белье.

Нельзя применять в качестве слабительного средства при отравлении жирорастворимыми веществами (фосфором, бензолом и др.) и при лечении глистной инвазии экстрактом мужского папоротника.

Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Масло для приема внутрь.

По 25, 30, 40, 50, 100 мл во флаконы из оранжевого стекла с винтовой горловиной с пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Формула-ФР»


Россия, 109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 139, офис 10

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872)41-04-73

 Директор

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»



Л.Я. Рабинович